

Ешимов А.Е.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА**

A.E. Eshimov

**RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS ON SEXUALLY TRANSMITTED
INFECTIONS IN PENAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN**

УДК: 616.97:343.812-036.22-084

В работе предоставлены результаты организации и проведения социологических исследований в условиях пенитенциарной системы Алматинской области Республики Казахстан. В результате получены поведенческие характеристики заключенных, свидетельствующие о необходимости разработке программ профилактики ИППП, направленных на предупреждение распространения инфекции как внутри системы УИС, так и за её пределами, при выходе осужденных на свободу.

Ключевые слова: инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (ИППП), социологические исследования, информированность, программа профилактики.

Results of the set-up and conduct of sociological surveys in the penal system of the Almaty Region of the Republic of Kazakhstan are presented. Behavioral characteristics of prison inmates were thus obtained, indicating the need for development of STI prevention programmes aimed at preventing the spread of STI both within the penitentiary establishment and beyond it when convicts are released from prison.

Key words: sexually transmitted infections (STI), sociological surveys, education, preventive programmers.

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в государствах СНГ в 1990-х годах, обусловила существенный рост инфекции, передаваемых половым путём (ИППП), среди населения. По данным С.А. Тимиргалиева (2003), Казахстан за последние три десятилетия переживает третью эпидемическую вспышку сифилиса [1]. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация сложилась в республике с гонореей и другими ИППП. Так, по данным Г.К. Аскаровой, А.И. Баева (2007), уровень заболеваемости населения гонореей в 2004 году достиг 97,6 на 100 тысяч населения [2]. В структуре ИППП по данным Казахского кожно-венеро-логического НИИ, ведущие места принадлежат трихомониазу (показатель 192,4 на 100 тысяч населения), сифилису (161,4), гонококковой инфекции (88,2). Далее, по значимости следуют: хламидийная инфекция (38,5), уреамикошшменная инфекция (16,4) и аногенитальная герпетическая инфекция (показатель 4,3 на 100 тысяч населения) [3].

Отметим, что особенностью переживаемого Казахстаном подъема заболеваемости ИППП является появление большого числа групп повышенного риска, которые играют важную роль в развитии, распространении ИППП среди населения. Данные

группы включают работниц сферы сексуальных услуг (РС), наркоманов, алкоголиков, подростков с девиантным или деликвентным поведением, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. В литературе мы встретили единичные работы, посвященные вопросам эпидемиологии, клиники, лечения и профилактики ИППП у социальных - дезадаптированных лиц. Недостаток научных работ, осуществляемых в условиях пенитенциарной системы объясняется отсутствием допуска в эти учреждения. В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы Казахстана (передача учреждений пенитенциарной системы под юрисдикцию Министерства юстиции), появилась реальная возможность сотрудничества систем ведомственного и общественного здравоохранения. С 2006 года НИКВИ совместно с медицинской службой УИС Алматинской области реализуется научно-исследовательская программа по изучению состояния проблемы ИППП в пенитенциарных учреждениях региона. В рамках данной программы, нами было предпринято изучение социально-поведенческих характеристик в среде заключенных. Проведение социологических исследований в пенитенциарной системе вызвано объективными причинами, связанными, в первую очередь, с необходимостью принятия администрацией УИС управленческих решений. Применительно к проблеме ИППП, социологический мониторинг в условиях УИС является важным элементом системы эпидемиологического надзора за ИППП.

В данном сообщении излагаются основные методические подходы, результаты социологических исследований по ИППП, проведенные в системе уголовно-исправительной системы Алматинской области.

Материалы и методы

Разработанная программа социологических исследований содержала в себе следующие структурные элементы:

- обоснование постановки проблемы ИППП в системе УИС Алматинской области;
- теоретико-методический подход к проведению исследования;
- краткое изложение концепции;
- определение конечных и промежуточных целей исследования;

- характеристика методов сбора информации, обработки анализа;
- определения количества и уровня квалификации участников исследования;
- калькуляция затрат и сроки исполнения работы;
- содержание промежуточного, итогового отчетов.

В процессе исследования были определены различные группы осужденных, разработана методология многоуровневого социологического мониторинга. В качестве объектов социологических исследований были взяты мужская и женская исправительные колонии. Всего было опрошено 347 мужчин и 269 женщин. При этом использовалась специально разработанная анонимная анкета, состоящая из 34 вопросов. Анкетирование проводилось с участием исследуемой колонии, опрошенным осужденным гарантировалась конфиденциальность и анонимность. Полученные в результате исследования данные были статистически обработаны.

Вычислялась средняя ошибка - m , достоверность разности средних показателей определялась по критерию Стьюдента- t , при $P > 95\%$.

Результаты и обсуждение

Социологические исследования показали, что большинство заключенных имели низкий образовательный уровень. 102 мужчин (29,4%), 47 женщин (17,4%) имели неполное среднее образование, 86 мужчин (24,8%), 131 женщина (48,6%) среднее образование, 88 мужчин (25,3%), 25 женщин (9,3%) среднее специальное образование. Отличительной особенностью исследуемых групп заключенных явился высокий удельный вес респондентов с низким месячным доходом на одного члена семьи (от 5 до 10 тысяч тенге). 13 опрошенных мужчин (3,8%), 6 женщин (2,2%) указали на постоянное употребление наркотических средств, 97 мужчин (27,9%), 35 женщин (13,0%) - на эпизодическое употребление наркотиков.

Интересными оказались данные о возрасте начала половой жизни. В основном большая часть опрошенных мужчин показала, что начали половую жизнь с 15-17 лет (44,1 ± 2,7%) и с 18-25 лет (45,5 ± 2,7%). Что касается заключенных женщин, то 66 респондентов (24,5 ± 2,6%) указали возраст начала сексуальных отношений - 15-17 лет, а 163 (60,5 ± 3,0%) - 18-25 лет. Отмечено, что 147 мужчин (42,8%), 101 женщина (37,5%) ведущим мотивом вступления в половые сношения назвали любовь, 127 мужчин (37,0%), 40 женщин (14,9%) - любопытство, интерес. На изнасилование указали 2,0% мужчины, 8,2% женщин, на алкогольные опьянения - 7,0% мужчин, 6,3% женщин, на прием наркотических средств - лишь 5,5% мужчин.

Известно, что определенное значение в передаче ИППП имеют количество половых партнеров и опыт пользования презервативами. На вопрос о количестве половых партнеров за последние 12

месяцев до осуждения 159 осужденных мужчин (45,8%) и 40 женщин (14,9%) указали от 6 до 10. Анализ анкет показал, женщины при наличии случайных сексуальных связей не пользуются презервативами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что респонденты имели достаточный опыт активной половой жизни до осуждения. Полагаем, что рост сексуальной активности молодых людей в республике связан со следующими причинами: недостатки в половом воспитании, ускоренное половое созревание, часто опережающее их социальное взросление, распространенность порнографической литературы, миграция молодежи в города для поиска работы, на учебу, приток в республику видеофильмов, пропагандирующих секс, жестокость, насилие. Отмечается, что недостаточность образования, проблемы с трудоустройством зачастую приводят молодежь к выключению из общественно-полезной деятельности и, как следствие, к нарушению закона.

Было изучено отношение опрошенных к венерическим болезням и ВИЧ/СПИДу. Установлено, что 80 мужчин (23,0%), 122 женщины (45,3%) за последние 12 месяцев болели ИППП. На вопрос «где на Ваш взгляд, более высокая вероятность заражения венерическими болезнями», 200 опрошенных мужчин (60,0%), 111 женщин (41,3%) отметили, что на свободе. В то же время 57 мужчин (17,1%), 19 женщин (7,0%) указали о возможности инфицирования ИППП и в местах лишения свободы, что необходимо учитывать при организации и проведении профилактических мероприятий в пенитенциарных учреждениях. Исследования показали высокую их осведомленность по вопросам ВИЧ / СПИД. В качестве профилактических мер против ВИЧ инфекции опрошенные отметили: использование презервативов, отказ от случайных половых связей. Изучая вопрос заинтересованности в получении информации о венерических заболеваниях, мы установили, что осужденные проявляют большой интерес к этой проблеме. Так, большинство заключенных мужчин и женщин ответили, что их интересует информация о венерических заболеваниях. Основными источниками информации о венерических болезнях, для заключенных являются, по их мнению, следующие: разговоры в кругу близких людей, беседы с медицинскими работниками.

Довольно часто они указывали на чтение специальной литературы (листки, брошюры) публикации в газетах, журналах и телевизионные передачи.

Проведенные социологические исследования показали, что существуют определенные предпосылки, обеспечивающие возможность дальнейшего распространения ИППП в Казахстане. Полученные сведения о поведенческих характеристиках осужденных, об уровне их осведомленности по вопросам ИППП, дают возможность

разработать программы по первичной профилактике ИППП, адаптированных для каждого типа заключенных.

Безусловно, возможный рост заболеваемости ИППП предъявляет высокие требования к организации дерматовенерологической помощи в учреждениях пенитенциарной системы. Задачей медицинской службы при этом является предупреждение распространения инфекции как внутри системы, так и за её пределами при выходе заключенных на свободу.

Литература:

1. Тимиргалиев С. А. Клинико-эпидемиологические особенности современного течения сифилиса в РК: автореф ... д-ра мед. наук. - Алматы, 2003. - 51 с.
2. Аскарлова Г.К., Баев А.И. Динамика заболеваемости сифилисом в РК//Материалы международной научно-практической конференции.- Астана, 2007. - С.134-137.
3. Жуматова Г.Г. Медико-социальные аспекты болезней, передаваемых половым путём //Центрально-азиатский медицинский журнал по общественному здравоохранению. - 2002. -№ 1. - С.55-58.

Рецензент: д.м.н. Джумалиева Г.А.
